Telefonnummer der/s behandelnden Arztin/Arztes:

Name der/s behandelnden Ärztin/Arztes:

Name des Behandlungszentrums:

Datum der Erstverordnung von Teriflunomid:

Name der Patientin/des Patienten:

info@kohlpharma.com

Ulesse Patientenkarte sowne Produktinformätionen zu Aubagio sind auch online durch Scannen des OR-Codes oder über www.kohlpharma.com/downloadbereich verfügbar. Gedruckte Exemplare können direkt bei kohlpharma GmbH unter unten genannten konhaktdaten beteillt werden: kohlpharma GmbH, im Hoishau 8, 66663 Merzig, Telefon: 06867/920-0, E-Mail:



PATIENTENKARTE ZUR SICHEREN ANWENDUNG

Teriflunomid

Bitte lesen Sie auch die Gebrauchsinformation (Packungsbeilage) zu Ihrem verordneten Arzneimittel aufmerksam durch



Allgemeine Hinweise

Bitte zeigen Sie diese Karte allen Ärzten oder medizinischen Fachkräften, von denen Sie versorgt werden (z.B. bei einem Notfall).

Diese Patientenkarte enthält wichtige Sicherheitsinformationen, die Sie bei Ihrer Behandlung mit Teriflunomid kennen und berücksichtigen müssen. Bitte lesen Sie diese Karte und die Gebrauchsinformation sorgfältig durch.



Wichtige Nebenwirkungen

 Dieses Arzneimittel kann Auswirkungen auf Ihre Leberfunktion, Ihren Blutdruck und auf bestimmte, für die Bekämpfung von Infektionen wichtige Blutzellen haben.

Wenn Sie eine der folgenden Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihren Arzt:

- Gelbfärbung der Haut oder des weißen Teils der Augen, dunkler Urin, Appetitlosigkeit, Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, Abgeschlagenheit, Juckreiz. In diesem Fall könnte ein Problem mit Ihrer Leber vorliegen.
- Hohe Temperatur (Fieber), Husten, Schüttelfrost, geschwollene Lymphknoten, verminderter oder schmerzhafter Harnfluss. In diesem Fall könnten Sie eine Infektion haben.

Für Frauen im gebärfähigen Alter, einschließlich Mädchen* und deren Eltern/Betreuungspersonen

- Beginnen Sie die Behandlung mit Teriflunomid nicht, wenn Sie schwanger sind oder vermuten, schwanger zu sein. Ihr Arzt wird Sie möglicherweise bitten, vorsorglich einen Schwangerschaftstest durchzuführen.
- Verwenden Sie während der Behandlung mit Teriflunomid eine zuverlässige Verhütungsmethode. Dies ist auch für eine gewisse Zeit nach der Behandlung erforderlich. Ihr Arzt wird Sie beraten und über die möglichen Risiken für das ungeborene Kind und die Notwendigkeit einer zuverlässigen Verhütungsmethode informieren.
- <u>Für Mädchen* und ihre Eltern/Betreuungspersonen</u>; Informieren Sie bitte den Arzt, wenn bei der Patientin die erste Regelblutung einsetzt. Ihr Arzt wird Sie beraten und über das mögliche Risiko für das ungeborene Kind bei einer Schwangerschaft und die Notwendigkeit einer zuverlässigen Verhütungsmethode informieren.
- Falls Sie Ihre Verhütungsmethode ändern oder schwanger werden möchten, informieren Sie Ihren Arzt.

Falls Sie schwanger werden oder vermuten, schwanger zu sein

- Beenden Sie die Anwendung von Teriflunomid und informieren Sie umgehend Ihren Arzt.
- Ihr Arzt wird Ihnen möglicherweise eine Behandlung mit bestimmten Arzneimitteln empfehlen, um Teriflunomid rasch aus Ihrem Körper zu entfernen.
- Bitte sprechen Sie auch mit Ihrem Arzt, wenn Sie stillen oder planen zu stillen.
- * Bitte beachten Sie, dass möglicherweise nicht alle Präparate für Patienten < 18 Jahre zugelassen sind.