

Patientenausweis

Eliquis®

(Apixaban)



-EA2-

**Das Kind oder die Betreuungsperson
sollte diesen Pass immer
bei sich tragen.**

**Zeigen Sie diesen Ausweis dem Apotheker, dem
Zahnarzt und allen Ärzten vor einer Behandlung.**

Information für Patienten/Betreuungspersonen

- Eliquis® sollte regelmäßig nach den Anweisungen des Arztes eingenommen bzw. gegeben werden. Wenn Sie eine Einnahme am Morgen vergessen haben, sollte diese zusammen mit der Dosis am Abend eingenommen bzw. gegeben werden. Eine vergessene Abenddosis darf nur am selben Abend nachgeholt werden. Am nächsten Morgen dürfen nicht zwei Dosen eingenommen bzw. verabreicht werden. Es sollte stattdessen am nächsten Tag mit der empfohlenen, zweimal täglichen Dosierung fortgesetzt werden
- Brechen Sie die Behandlung mit Eliquis® nicht ohne vorherige Rücksprache mit dem Arzt ab, da beim Patienten das Risiko eines Blutgerinnsels oder anderer Komplikationen besteht.
- Eliquis® hilft, das Blut zu verdünnen. Dies kann jedoch das Risiko für Blutungen erhöhen.
- Anzeichen und Symptome von Blutungen können Blutergüsse oder Einblutungen unter der Haut, Teerstuhl, Blut im Urin, Nasenbluten, Schwindel, Müdigkeit, Blässe, Schwäche, plötzliche starke Kopfschmerzen, Abhusten von Blut oder blutiges Erbrechen sein.
- **Suchen Sie umgehend einen Arzt auf**, falls die Blutung nicht selbständig aufhört.
- Wenn beim Patienten eine Operation oder ein invasiver Eingriff vorgenommen werden muss, informieren Sie den Arzt vor der Operation, dass das Kind Eliquis® einnimmt.

Juli 2024

Ich werde mit dem Antikoagulans Eliquis® (Apixaban) behandelt, um der Entstehung von Blutgerinnseln vorzubeugen.

Information für Arzt und Apotheker

- Eliquis® (Apixaban) ist ein orales Antikoagulans, das durch die direkte, selektive Hemmung des Blutgerinnungsfaktors Xa wirkt.
- Eliquis® kann das Risiko für Blutungen erhöhen. Im Falle einer schweren Blutung ist die Behandlung mit Eliquis® unverzüglich abzubrechen.
- Die Behandlung mit Eliquis® erfordert keine Routineüberwachung der Exposition. Ein kalibrierter quantitativer Anti-Faktor Xa Test kann in Ausnahmesituationen, z.B. bei Überdosierungen und Notfalloperationen, nützlich sein (Prothrombinzeit (PT), International Normalized Ratio (INR) und aktivierte partielle Thromboplastinzeit (aPTT) Gerinnungstests sind nicht empfohlen) – siehe Fachinformation.
- Ein Arzneimittel zur Aufhebung der Anti-Faktor-Xa-Aktivität von Apixaban steht für Erwachsene zur Verfügung; seine Sicherheit und Wirksamkeit ist jedoch bei pädiatrischen Patienten nicht erwiesen (siehe Fachinformation zu Andexanet alfa).

Bitte füllen Sie diesen Abschnitt aus oder bitten Sie Ihren Arzt darum

Name: _____

Geburtsdatum: _____

Indikation: _____

Gewicht: _____

Dosierung: _____ mg 2 x täglich

Name des Arztes: _____

Telefonnummer des Arztes: _____