

Lesen Sie bitte auch die Gebrauchsinformation.

kohlpharma

Ihr Name:

**Name des Arztes, der Jyseleca®
(Filgotinib) verschrieben hat:**

Telefonnummer des Arztes:

Patientenkarte zur sicheren Anwendung

Bitte tragen Sie diese Patientenkarte stets bei sich.



Zeigen Sie diese Karte jedem Arzt und anderen Fachkräften im Gesundheitswesen, die an Ihrer medizinischen Versorgung beteiligt sind, z. B. andere Ärzte als der Filgotinib verordnende Arzt oder Mitarbeiter in der Notaufnahme.

Diese Patientenkarte enthält wichtige Informationen zur sicheren Anwendung von Jyseleca® (Filgotinib). Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsinformation.

Version 3.0

(Datum der Genehmigung: 05.2023)

<http://www.bfarm.de/schulungsmaterial/>

Infektionen

Die Behandlung mit Filgotinib kann bestehende Infektionen verschlimmern oder die Wahrscheinlichkeit für eine neue Infektion erhöhen. Sprechen Sie unverzüglich mit Ihrem Arzt, wenn Sie Anzeichen einer Infektion bemerken, wie z. B.:

- Fieber, nächtliches Schwitzen, Schüttelfrost, Gewichtsverlust, anhaltender Husten, Kurzatmigkeit, verstärkte Müdigkeit, schmerzhafter Hautausschlag mit Bläschenbildung.

Impfstoffe

- Sie sollten während der Behandlung oder unmittelbar vor Behandlungsbeginn mit Filgotinib gewisse Impfstoffe, sogenannte Lebendimpfstoffe, (z. B. Zostavax® zur Vorbeugung von Gürtelrose) nicht erhalten.
- Sprechen Sie Ihren Arzt vor einer Impfung darauf an – er weiß, welche Impfstoffe vor oder während der Behandlung mit Filgotinib nicht gegeben werden dürfen.

Blutgerinnsel in den Beinvenen oder der Lunge

- Sprechen Sie unverzüglich mit Ihrem Arzt, wenn Sie Symptome von Blutgerinnseln in Ihren Beinen oder in Ihrer Lunge wie Schwellung oder Schmerzen in einem Bein, Wärmegefühl oder Rötung in einem Bein, Schmerzen im Brustbereich oder Kurzatmigkeit bekommen.

Cholesterin

- Ein hoher Cholesterinspiegel ist ein bedeutsamer Risikofaktor für Herzkrankungen. Während Ihrer Einnahme von Filgotinib wird Ihr Arzt Ihren Cholesterinspiegel überprüfen, um zu entscheiden, ob Sie eine Behandlung zur Senkung Ihres Cholesterinspiegels benötigen.

Schwangerschaft, Verhütung und Stillzeit

- Nehmen Sie Filgotinib nicht ein, wenn Sie schwanger sind oder vermuten, schwanger zu sein.
- Nutzen Sie während der Einnahme von Filgotinib sowie für mindestens eine

Woche nach der letzten Anwendung eine zuverlässige Verhütungsmethode.

- Sprechen Sie unverzüglich mit Ihrem Arzt, wenn Sie während der Behandlung schwanger werden.
- Während der Einnahme von Filgotinib dürfen Sie nicht stillen.

Krebserkrankungen und Hautkrebs

- Jyseleca® kann zu einem erhöhten Krebsrisiko führen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn bei Ihnen während oder nach der Behandlung ein neuer Hautfleck auftritt oder sich das Aussehen von bestehenden Hautflecken verändert.

Erkrankungen des Herzens

- Jyseleca® kann zu einem erhöhten Risiko für bestimmte Herzerkrankungen führen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn bei Ihnen starke Schmerzen in der Brust (die sich auf Arme, Kiefer, Nacken und Rücken ausbreiten können) oder Engegefühl in der Brust, Kurzatmigkeit, Übelkeit, Erbrechen, Schmerzen im Oberbauch oder Schwindel auftreten.