

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die korrekte Darreichungsform und Stärke von MabThera® auswählen



SUBKUTANE INJEKTION

**MabThera 1.400 mg
NUR ZUR ANWENDUNG BEI NHL***



Rosa Flip-off-Deckel

Direkt aus der Durchstechflasche entnehmen und als subkutane Injektion verabreichen



Überprüfen Sie vor der Anwendung die für MabThera SC spezifischen Verpackungscharakteristika:

Rot gedruckt: „**Nur zur subkutanen Anwendung**“, „**Lösung zur subkutanen Injektion**“ und „**subkutan**“

INTRAVENÖSE INFUSION

MabThera 100 mg Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
MabThera 500 mg Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
Zur Anwendung bei allen zugelassenen Indikationen von MabThera#



Mit 0,9%iger Kochsalzlösung oder 5%iger Glukoselösung verdünnen und als intravenöse Infusion verabreichen



* NHL = Non-Hodgkin-Lymphom.

Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (Fachinformation).

Beachten Sie bitte für weitere Informationen die Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (Fachinformation).

Verwenden Sie den Abziehstreifen des Etiketts, um sicherzustellen, dass Ihrem Patienten, wie unten dargestellt, die richtige Formulierung und Stärke verabreicht wird.

**MabThera 1.400 mg Lösung zur subkutanen Injektion
NUR ZUR ANWENDUNG BEI NHL**



1. Das Etikett der Durchstechflasche von MabThera 1.400 mg hat einen abziehbaren Streifen.



2. Entfernen Sie den Abziehstreifen.



3. Kleben Sie den Abziehstreifen auf die Spritze.



kohlpharma GmbH
Im Holzhaus 8
66663 Merzig
Telefon: 06867 / 920-0
E-Mail: info@kohlpharma.com
© 2017 - Alle verwendeten Handelsnamen sind rechtlich geschützt.

Version 2.0
Erstelldatum: April 2017
Datum der Behördengenehmigung: 21/04/2017

