

Rixathon® ist **NUR zur INTRAVENÖSEN Anwendung** vorgesehen – **NICHT zur SUBKUTANEN Anwendung**

Andere Rituximab-Produkte zur subkutanen Anwendung sind im Markt erhältlich.



INTRAVENÖSE INFUSION

Rixathon® 100 mg/10 ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Rixathon® 500 mg/50 ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Zur intravenösen Anwendung bei allen zugelassenen Indikationen von Rixathon®

Rixathon® 100 mg

Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Rituximab

100 mg/10 ml

Zur intravenösen Infusion
nach Verdünnung

2 Durchstechflaschen mit 10 ml

SANDOZ & Novartis
Division

Rixathon® 500 mg

Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Rituximab

500 mg/50 ml

Zur intravenösen Infusion
nach Verdünnung

1 Durchstechflasche mit 50 ml

SANDOZ & Novartis
Division

Mit 0,9%iger Kochsalzlösung oder 5%iger Glucoselösung verdünnen und als intravenöse Infusion verabreichen.

▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Sie können dabei helfen, indem Sie jede auftretende Nebenwirkung melden. (siehe Fachinformation)

Version 1.0
Stand: Juni 2017

kohlpharma GmbH
Im Holzhau 8
66663 Merzig
Telefon: 06867 / 920-0
E-Mail: info@kohlpharma.com