


- Im Falle einer Schwangerschaft wird Ihr Arzt mit Ihnen das Risiko schädlicher Wirkungen, die die Behandlung auf das Kind haben könnte, besprechen und gegebenenfalls weitere Tests, z. B. eine Ultraschalluntersuchung, anordnen. Etrasimod muss bei Eintreten einer Schwangerschaft abgesetzt werden.



Sie haben jederzeit die Möglichkeit, diese Patientenkarte unter [www.kohlpharma.com/downloadbereich/](http://www.kohlpharma.com/downloadbereich/) herunterzuladen.

## Wichtige Informationen zur Empfängnisverhütung und Schwangerschaft

Bitte beachten Sie ebenfalls den Leitfaden zur sicheren Anwendung für Patienten und die Gebrauchsinformation zu Velsipity (Etrasimod)



## Patientenkarte zur sicheren Anwendung für Patientinnen, die mit Velsipity (Etrasimod) behandelt werden und schwanger werden könnten

- Bei Anwendung während der Schwangerschaft kann Etrasimod das ungeborene Kind schädigen. Mögliche Risiken können der Verlust des ungeborenen Kindes oder Geburtsfehler sein.
- Sie dürfen Etrasimod nicht anwenden, wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie schwanger werden könnten und keine wirksame Verhütungsmethode anwenden.
- Vor dem Beginn der Behandlung müssen Sie einen Schwangerschaftstest machen und Ihrem Arzt vorlegen, damit Ihr Arzt eine Schwangerschaft ausschließen kann.
- Während der Behandlung mit Etrasimod und bis mindestens 14 Tage nach dem Ende der Behandlung müssen Sie eine wirksame Verhütungsmethode anwenden und durch Schwangerschaftstests prüfen, ob Sie tatsächlich nicht schwanger geworden sind.
- Sagen Sie sofort Ihrem Arzt Bescheid, wenn Sie schwanger sind oder stillen oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein, oder beabsichtigen, schwanger zu werden.